

使用上の注意改訂(ジヒドロコデインリン酸塩)のお知らせ

お客様各位

平素は弊社製品につきまして格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

今般、「ジヒドロコデインリン酸塩」を含有する製剤(かぜ薬、鎮咳去痰薬)の「使用上の注意」の一部を改訂いたしますので、ご連絡申し上げます。

順次改訂作業は進めてまいりますが、在庫等の関係上、改訂された製品がお手元に届くまでには、時間がかかると予想されます。

つきましては、今後の販売・服用の際にご参照いただくよう、お願いいたします。

・改訂内容

かぜ薬・鎮咳去痰薬
してはいけないこと 1. 次の人は服用しないこと <u>12歳未満の小児。</u> (下線部追記)※

※エフストリンせき止め液 10 及び NID せき止め液 1 回量飲みきりタイプについては、「15歳未満の小児。」が追記されます。

・改訂理由

令和元年 7 月 9 日付 薬生安発 0709 第 9 号 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知による。

・対象品目

かぜ薬(4品目)	
小児用ハイセーフーS (製造中止品目)	ヘルビック S 顆粒
ハイセーフーS 顆粒	ヘルビック S 顆粒・ゴールド

鎮咳去痰薬(12品目)	
エフストリン	新エフストリン液
エフストリン液	新コデステシン液 (製造中止品目)
エフストリン顆粒 K	ドニーせき止め P
エフストリンせきどめ液	NID せき止め液 1 回量飲みきりタイプ
エフストリンせきどめ液 10	ビステイーせき止め液
コデステシン錠	ビステイーせき止め顆粒 N

・製造中止品目については添付文書の改訂は行いませんが、該当しますので注意してください。